

АЛГОРИТМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ БОЛИ В ГРУДИ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - ранний, не позднее чем в течение 10-20 мин, вызов СМП.
В первый час умирает от 30 до 50 % от всех умирающих по этой причине



ПАЦИЕНТ ИСПЫТЫВАЕТ БОЛЬ
В ГРУДИ / ДИСКОМФОРТ



Пациент (или человек, оказывающий ему помощь) ранее проходил инструктаж, и/или изучил памятку и/или имеет её «перед глазами» о симптомах сердечного приступа и правилах приёма нитроглицерина (НГ) и ацетилсалициловой кислоты (АСК) при его развитии?

Нет

Да

Сохраняется дискомфорт/боль в грудной клетке или ухудшение состояния в течении 5 минут после его начала?

Нет

Да

Записаться
на приём к врачу

Следовать инструкции
участкового врача

При наличии этих признаков
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите их
при вызове Скорой помощи
по телефонам:

Tele 2 103 МТС 103
Билайн 103 Мегафон 030

Принять 1 дозу НГ под язык
Таблетку АСК (250 мг) разжевать

Если боль не проходит: через 5-7
минут повторить приём НГ,
но не более 2 раз по 1 дозе

Следовать инструкции
диспетчера 03,
а затем врача фельдшера
скорой помощи